

気道感染症の抗菌薬適正使用に関する提言

正誤表

記載に誤りがありましたので、下記のように訂正いたします。

2020年11月

気道感染症抗菌薬適正使用委員会

感染症学雑誌第93巻第5号

P628「II. 急性鼻副鼻腔炎、4. 急性鼻副鼻腔炎の治療、2) 治療薬の選択

(1) 成人」

誤

・CFPN-PI 経口 1回100mg (高用量 200mg) ・1日3回 5日間.

正

・CFPN-PI 経口 1回100mg (高用量 150mg) ・1日3回 5日間.

誤

TFLX 経口 1回 100～150mg ・ 1日 2～3回 5日間.
正
TFLX 経口 1回 150mg ・ 1日 2～3回 5日間.

P629 「Ⅲ. 急性咽頭・扁桃炎、表2」

誤
Malsaac
正
McIsaac

P631 「Ⅲ. 急性咽頭・扁桃炎、3. 治療、4) 治療薬の選択、(1) 成人」

誤
・ CFPN-PI 経口 1回 100mg (再発例では 200mg) ・ 1日 3回 5日間.
正
・ CFPN-PI 経口 1回 100mg (再発例では 150mg) ・ 1日 3回 5日間.

P632 「図6 急性咽頭・扁桃炎診療アルゴリズム（小児）」

誤

・抗菌薬：その他の選択（レスピラトリーキノロン・セフェム）

正

・抗菌薬：その他の選択（セファロスポリン・マクロライド）