

気道感染症の抗菌薬適正使用に関する提言（ダイジェスト版）

正誤表

記載に誤りがありましたので、下記のように訂正いたします。

2020年11月

気道感染症抗菌薬適正使用委員会

2019年11月30日 第1版

P3「急性鼻副鼻腔炎、4 急性鼻副鼻腔炎の治療、治療薬の選択（1）成人」

誤
・CFPN-PI 経口 1回100mg（高用量 200mg）・1日3回 5日間.
正
・CFPN-PI 経口 1回100mg（高用量 150mg）・1日3回 5日間.
誤
TFLX 経口 1回 100～150mg・1日2～3回 5日間.

正

TFLX 経口 1回 150mg・1日 2～3回 5日間.

P6「急性咽頭・扁桃炎、3 急性咽頭・扁桃炎の診断 表2」

誤

Malsaac

正

McIsaac

P6「急性咽頭・扁桃炎、4 急性咽頭・扁桃炎の治療、(1) 成人」

誤

・CFPN-PI 経口 1回 100mg (再発例では 200mg)・1日 3回 5日間.

正

・CFPN-PI 経口 1回 100mg (再発例では 150mg)・1日 3回 5日間.

P9「図5 急性咽頭・扁桃炎診療アルゴリズム（小児）」

誤

・抗菌薬：その他の選択（レスピラトリーキノロン・セフェム）

正

・抗菌薬：その他の選択（セファロスポリン・マクロライド）